

Noticias de interés farmacoterapéutico.

Recuperación de peso

En *BMJ* se ha publicado [recuperación de peso tras la interrupción de la medicación para el control del peso: revisión sistemática y metanálisis](#). Se incluyeron 37 estudios (9341 participantes), concluyéndose que tras suspender estos medicamentos, los pacientes recuperan peso a un ritmo medio de 0,4 kg/mes, siendo mayor (0,8 kg/mes) con semaglutida y tirzepatida. Tras la interrupción, se recupera el peso basal en 1,5-1,7 años.

Insuficiencia cardíaca valvular

Se ha publicado en la revista *European Heart Journal* una revisión sobre [Insuficiencia cardíaca valvular: evolución de los enfoques farmacológicos](#). Este artículo ofrece una visión general de la evidencia sobre el tratamiento en pacientes con valvulopatía crónica.

Resistencia antimicrobianos

BMJ ha publicado una revisión titulada [uso y resistencia a los antimicrobianos](#), que resume las principales acciones realizadas recientemente e identifica las posibles amenazas futuras, revisa los antibióticos disponibles y los mecanismos de resistencia y el desarrollo nuevos antibióticos. Se señala que la prescripción empírica de antibióticos esenciales sigue siendo la piedra angular del tratamiento, y preservar su eficacia es fundamental para una atención médica eficaz.